

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Regisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège, rédigé en collaboration avec MM. Mailhol, Vène, Rebelle (Loudes), Boy (CAL), Boyer (GVA), Bernard, Faure (SPV)

N° 10 C du 7 JUIN 1989

GRANDES CULTURES N° 9

## TOURNESOL

**PHOMOPSIS** : Nous observons les premières projections de spores, peu importantes pour le moment; compte-tenu du stade d'évolution du champignon, cette situation peut évoluer très rapidement avec des conditions humides.

Certaines cultures ont atteint le stade limite de passage avec le tracteur et quelle que soit la variété **TRAITEZ** impérativement ces cultures dès réception du bulletin avec

**PELTAR Flo** à 7 l/ha

( ou Corbel Duo à 1,6 l/ha produit venant d'obtenir une dérogation pour la campagne 1989, mais pour lequel nous possédons moins de références )

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'évolution du risque

## MAIS

**SESAMIE** : Deuxième pic de vol, important par secteur "Pexiora", "Issel" si votre dernière protection remonte à 15 jours renouvelez le traitement. Compte-tenu du risque **PYRALE** du maïs nous vous recommandons d'utiliser une matière active permettant de contrôler à la fois ce ravageur et la sésamie

<b>TALSTAR</b>	0,2	l/ha	(actif sur cicadelles à 0,25 l/ha)
<b>SUMICIDIN 10</b>	0,75	l/ha	
<b>DECIS CE</b>	0,5	l/ha	

Tirage du 7 Juin 1989 - 1700 exemplaires

(c) Bulletin technique des Avertissements Agricoles - CARCASSONNE 1989 - SPV

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5. place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel. 67 92 41 42



# CYCLE DE DIAPORTHE HELIANTHI

FORME CONIDIENNE: PHOMOPSIS HELIANTHI

(PHOMOPSIS DU TOURNESOL)


(C) SPV:FDGDEC-AUDE  
PHOTO: B. SICHEZ



SYMPTOME SUR FEUILLE



TACHES SUR TIGE



ASQUE CONTENANT 8 ASCOSPORES


(G: 600 X)



AVIS DE TRAITEMENT



VERSE



PIEGE A ASCOSPORES



DEGATS

PRINTEMPS

ETE

DIFFERENCIATION DES PERITHECES  
DANS LES RESIDUS (G:40 X)

HIVER



AUTOMNE

CONSERVATION DU CHAMPIGNON DANS LES RESIDUS DE CULTURE